

100 % de Cobertura
<b>Hipoglucemiantes orales (No requieren Auditoría Médica)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• IDPP4: Vildagliptin, Sitagliptina (solas o combinadas)</li> <li>• Biguanidas: Metformina.</li> <li>• Sulfonilureas: Glipizida, Glimepiride, Glicazida, solas o combinadas con Metformina.</li> <li>• Teneigliptina</li> <li>• Otras: Pioglitazona (sola o combinada con Metformina), Acarbosa, Repaglinida, Rosiglitazona.</li> </ul>

Insulinas
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Insulinas Humanas: Regular, NPH (No requieren Auditoría Médica)</b></li> <li>• <b>Análogos de insulina (Deberá presentar el Formulario para solicitar excepciones por Diabetes).</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rápidas: Lispro, Glulisina y Aspártica.</li> <li>b. De acción prolongada: Detemir, Glargina U100 y U300, Degludec.</li> <li>c. Premezclas</li> </ul> </li> </ul>

Insumos Básicos	
Insumo	Cantidad anual
Lancetas descartables para punción digital	100 200
Agujas descartables	300 (sin tratamiento intensificado) 730 (con tratamiento intensificado)
Jeringas descartables	300 (sin tratamiento intensificado) 730 (con tratamiento intensificado)
Bombas de infusión continua para insulina y sus insumos descartables. Según prescripción médica especializada.	Fundamentado por el Médico especialista en diabetes, la prescripción se deberá realizar por la denominación genérica, no por nombre comercial y deberá ser evaluado y aprobado por Auditoría.
Glucagon 1mg	Indicado en personas con diagnóstico de DM1 confirmado por resumen de historia clínica. Se autorizará la cobertura 1 por año
Glucómetro	Solo de ser necesario: 1 cada dos años

Tiras reactivas	
Tipo de paciente	Cantidad anual
Paciente diabético en tratamiento solo con metformina.	50 tiras.
Paciente diabético en tratamiento con 2 medicamentos vía oral: Metformina, y/o sulfonilureas o DPPIV.	100 tiras.
Paciente con DBT 2 en tratamiento con Hipoglucemiante oral y 1 dosis basal de insulina. Provisión de tiras reactivas para automonitoreo glucémico (AMG).	400 tiras.
Paciente diabético tipo I y II o DBT gestacional, con múltiples dosis diarias de insulina (tratamiento intensificado).	1500 tiras.
Casos especiales: labilidad extrema, uso de ICI, gran variabilidad glucémica demostrada.	Hasta 1800 tiras.
Tiras Reactivas para medir acetona en sangre y orina.	50 tiras.

70 % de Cobertura
• Análogo del receptor de GLP-1: Liraglutide. (Deberá presentar el Formulario para solicitar excepciones por Diabetes).

40 % de Cobertura
<b>Hipoglucemiantes orales</b>
<b>No requieren Auditoría previa</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• DPP4: Saxagliptina y Linagliptina (solas o combinadas con Metformina).</li> <li>• IDPP4: Teneigliptina.</li> </ul>
<b>SGLT-2: solas o combinadas con Metformina</b>
<b>No requieren Auditoría previa</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Canaglifozina 100 mg y 300 mg</li> <li>• Dapaglifozina 10 mg</li> </ul>
<b>Deberá presentar el Formulario para solicitar excepciones por Diabetes</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• SGLT-2: Empaglifozina 10 mg y 25 mg</li> <li>• Análogos del receptor de GLP-1: Liraglutida</li> </ul>